

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

DLP 12-8-82017387

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

(AUDE GARD HERAULT LOZERE PYRENEES ORIENTALES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE BAT 5 PLACE CHAPTAL

34076 MONTPELLIER CEDEX TEL 92.41.42

ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de recettes de la D.D.A

C.C.P. Montpellier 5238-57

10 AOUT 1982

ÉDITION DU LIMOUXIN

N° 10

(rédigé en collaboration avec la CAVALE)

TRAITEZ

## - LE BOTRYTIS

Sur l'ensemble de l'aire d'appellation le traitement spécifique de la mi-véraison sera à effectuer impérativement dès que vos parcelles auront atteint ce stade.

Intervenir avec Ronilan	2kg/ha
ou Sumislex	2 kg/ha

## - LE DESSECHEMENT DE LA RAFLE

En cas de présence, traiter immédiatement (huit jours avant véraison) au sulfate de magnésie ou au nitrate de magnésie (Magonia).

Les meilleurs résultats dans l'essai "dessèchement" en 1981 ont été obtenus avec le nitrate de magnésie à la concentration de 50 % dans au moins 500 litres d'eau pour amener 20 - 25 kg de produit à l'hectare.

Comme pour le botrytis diriger les jets vers les grappes.

Répétez le traitement huit jours après la véraison.

## - L'OIDIUM

Toujours très virulent. Présence de nombreux foyers. Ne relâchez pas vos interventions. Si le temps le permet, effectuez un poudrage au stade véraison.

Tirage du 10 AOUT 1982 - MONTPELLIER - 700 exemplaires

C - Bulletin Technique des Avertissements Agricoles MONTPELLIER 1982

G. THEISSEN

715